

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
TURUNÇGİLLER (Limon, Portakal, Greyfurt, mandarin)	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	200 g/100 L su	14 gün
	Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L su Meyveler ilaçlı suya 3 dakika süreyle daldırılır.	
ARMUT*	Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (<i>Erwinia amylovora</i>)	400 g/100 L su	14 gün
HIYAR	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	3 gün
KAVUN	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	3 gün
SOĞAN	Soğan mildiyüsü (<i>Peronospora destructor</i>)	150 g/100 L su	14 gün
DOMATES (sera)	Domates (sera) Mildiyüsü (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/100 L su	7 gün

* HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ ENFEKTELİ KISIMLAR DEZENFEKTAN BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

INKAT WG 80 bitki öz suyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungusittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir iletme sağlanmalıdır.

Hiyar, kavunda mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla bir üretim sezonunda en fazla 2 uygulamaya devam edilir.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:

* Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. Uygulama: Havalara yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

* Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğine kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgillerde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü: Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.



INKAT WG 80

Suda dağılılabilen granül (WG)

GRUBU	P07	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

AKTİF MADDEİN ADI VE MİKTARI:
%80 Fosetyl-AI

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz ve mukoz membranlarda tahriş olabilir. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkartın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. Ortaya çıkan ve kalıcı olan şikayetlerde doktoru haberdar ediniz.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız.

Cilt ile temas: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız.

Göz ile temas: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Tedavi göz doktoru tarafından yapılmalıdır.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir. Özel bir antidot bilinmiyor. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı..
İÇİNDEKİLER
Fosetil alüminyum
ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ TEHLİKE ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 15 dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN, NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçın. Uygulama talimatlarına uyunuz.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

-INKAT WG 80 hızlı nem çekici olduğundan topaklaşma eğilimindedir. İnce hava almayacak şekilde korunmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklikler gözlemlenmez.

FİRMA BEYANI
Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarla uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün hatasız depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer SAS, Division Crop Science

Site Industriel Villefranche,

1 avenue Edouard Herriot,

F-69400 Villefranche-Limas, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53

34771 Ümraniye / İstanbul

Ulaştırma A.Ş.
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No: 53 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

13 Aralık 2024

Armut ateş yanıklığı:**Çiçek dönemi uygulamaları:**

Tahmin-uyarı modellerinin uygulandığı yörelerde çiçek dönemi uygulamaları: Kullanılan modele göre enfeksiyon riski uyarısı yapıldığında en geç 24 saat içinde ruhsatlı preparatlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçeklenme dönemi içinde ikinci bir uyarı yapıldığı takdirde ilaçlama tekrarlanmalıdır. Aksi takdirde ilaçlamalara son verilmelidir.

Tahmin-uyarı modeli uygulanmayan yörelerde çiçek dönemi uygulamaları: Çiçeklenme başlangıcından (beyaz rozet) itibaren ılık (günlük ortalama sıcaklık 15°C ve üzeri), yağmurlu ve nemli koşullar devam ediyorsa, 5'er gün ara ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçek petal yapraklarının dökülmesiyle birlikte çiçek enfeksiyon riski ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak, çiçeklenme dönemi veya çiçeklenme sonrası aktif sürgün gelişiminin devam ettiği dönemde don, dolu, kum fırtınası gibi ağaçta yaralanmaya neden olan iklim olayları gerçekleşirse 18 saat içinde ilaçlama yapılmalıdır.

Soğan mildiyözü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla bir üretim sezonunda en fazla 2 uygulamaya devam edilir.

Domates mildiyözü (sera): Uygulamaya çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küle gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla bir üretim sezonunda en fazla 2 uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

INKAT WG 80 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **P07** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için INKAT WG 80'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**P07 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız, önerilmez.

**INKAT WG 80**

Suda dağılılabilen granül (WG)

GRUBU	P07	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

AKTİF MADDEİN ADI VE MİKTARI:
% 80 Fosetyl-AI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

13 ARALIK 2024

N. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer SAS, Division Crop Science
Site Industriel Villefranche,
1 avenue Edouard Herriot,
F-69400 Villefranche-Limas, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34771 Ümraniye / İstanbul

Mehtap Aktepe
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No: 53 - Ümraniye - İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6