

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası: 27.01.2020 / 11562

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Antepfıstığı	Antepfıstığında Karazenk Hastalığı (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	20 ml/100 L su	10 gün
Fındık	Fındıkta Külleme Hastalığı (<i>Erysiphe</i> sp.)	20 ml/da	10 gün
Bağ*	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	20 ml/100 L su	14 gün
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Biber (sera)	Patlıcangillerde Külleme [<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>]	20 ml/100 L su	3 gün
Biber (tarla)	Patlıcangillerde Külleme [<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>]	25 ml/da	7 gün
Domates (sera)	Patlıcangillerde Külleme [<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>]	20 ml/100 L su	3 gün
Domates (tarla)	Patlıcangillerde Külleme [<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>]	25 ml/da	7 gün
Hıyar (sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Kornişon (sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Kavun (tarla)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/da	3 gün
Karpuz (tarla)	Kabakgillerde Antraknoz (<i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Colletotrichum lagenarium</i>)	20 ml/da	3 gün
Kiraz	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Kiraz	Meyve Monilyası [Mumya] (<i>Monilinia fructigena</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Şeftali	Şeftali Küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Badem	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	25 ml/100L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Antepfıstığında Karazenk Hastalığı: 1. İlaçlama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir. 2. ilaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilmelidir.

Fındıkta Külleme hastalığı: *Erysiphe* sp.'nin neden olduğu Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. İklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer uygulamalara hasada kadar devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
03 Ekim 2024



LUSEN SC 500

Süspansiyon konsantr (SC)

GRUBU	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

250 g/L Fluopyram + 250 g/L Trifloxystrobin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürününü kullanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf ediniz.

Soluması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınır.

Yutulması halinde: Ağzı çalkalayınız. Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.

ULUSAL ZEHRİ MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Fluopyram
Trifloxystrobin
ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUIH208 Trifloksistrobin, 1,2-Benzisothiazolin-3-one, reactive chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz k... yıkayınız.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sig... P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz kor... P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEF... doktora/hekimi arayın.

P330 Ağzınızı çalkalayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

EUIH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınma... talimatlarına uyunuz.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Suda yaşayan canlılar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü suların... kaçınınız.

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza edin...

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan... iki (2) yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik o...

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uyg... etkinliğini garanti eder. Ürünün hatalı depolanmasından, hatalı... uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk...

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer SAS, Division CropScience,

Site Industriel Villefranche

1 avenue Edouard Herriot,

F-69400 Villefranche-sur-Saône, France

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

FSM Mah. Balkan Cad. No: 53

34770 Ümraniye / İstanbul

Mob. 0532 123 45 67
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
No: 53 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166

Bağda Bağ Küllemesi Hastalığı: 1. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm olduğunda (G devresi), 2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcukları ayrıldığında (H devresi), 3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları dökülüp kuruklar küçük saçma tanesi iriliğinde olduğunda (J devresi), 4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılacak ilacın etki süresi, meteorolojik faktörler ve hastalığın seyri göz önünde bulundurularak tanelere ben düşme zamanına kadar (L-M devresi) devam etmelidir.

Kayısıda Çiçek Monilyası: 1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10-12 gün arayla devam edilmelidir.

Biber (tarla) Patlıcangillerde Külleme: İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10-12 gün arayla devam edilmelidir. Bir üretim sezonunda en fazla 2 uygulama yapılır.

Domates (sera) Patlıcangillerde Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10-12 gün arayla devam edilmelidir.

Domates (tarla) Patlıcangillerde Külleme: İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10-12 gün arayla devam edilmelidir. Bir üretim sezonunda en fazla 2 uygulama yapılır.

Hıyar (sera) ve Kornişon (sera) Kabakgillerde Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10-12 gün arayla devam edilmelidir.

Kavun (tarla) Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Karpuz (tarla) Kabakgillerde Antraknoz: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az % 80'e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanmasıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

Kirazda Çiçek Monilyasına karşı: 1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda Meyve Monilyası (Mumya) hastalığına karşı: Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali Küllemesine karşı: 1. ilaçlama: Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollere, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı % 3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk ilaçlama yapılmalıdır. 2. ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilmelidir. Epidemiyollarında, gerekirse hasattan sonra da büyüyecek olan sürgün ve yaprakları korumak için mücadele sürdürülebilir.

Bademde Çiçek Monilyası Hastalığı: 1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır. Bir üretim sezonunda en fazla 2 uygulama yapılır.

Aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını (en fazla iki uygulama) aşmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

LUSEN SC 500 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LUSEN SC 500'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını (en fazla iki uygulama) aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (C2:7 ve C3:11 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı bir sezonda ardi ardına kullanımdan kaçınılmalı ve araya etki şekli farklı fungisitler kullanılmalıdır. Direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını (en fazla iki uygulama) aşmayınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.



LUSEN SC 500

Süspansiyon konsantre (SC)

GRUBU	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

250 g/L Flupyrim + 250 g/L Trifloxystrobin



ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer SAS, Division CropScience,
Site Industriel Villefranche,
1 avenue Edouard Herriot,
F-69400 Villefranche-sur-Saône, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İstanbul

Nesrin Çakır Arıcan
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan
No: 53 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 61

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

03 Ekim 2024