

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası: 25.09.2009 / 7203

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Turunçgil**	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	100 ml/100 L su, nimf - ergin	14 gün
	Sarı kabuklubiti (<i>Aonidiella citrina</i>)		
	Kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)		
	Yaprakbitleri		
Armut	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	75 ml/100 L su, nimf - ergin	
	Turunçgil yeşil yaprakbiti (<i>A. citricola</i>)		
	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 ml/100 L su, nimf - ergin	21 gün
	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	50 ml/100 L su, nimf - ergin	21 gün
Şeftali - Nektarin	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	75 ml/100 L su, nimf - ergin	21 gün
	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	75 ml/100 L su, larva	
Bağ*	Unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	100 ml/100 L su, nimf - ergin	14 gün
Karpuz	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	75 ml/da, nimf - ergin	3 gün
Marul	Yaprakbitleri		
	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)		
	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)		
	Marul yaprakbiti (<i>Nasonovia ribisnigri</i>)	75 ml/da, nimf - ergin	7 gün
Domates (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 L su, larva - pupa	3 gün
Domates (tarla)	Yaprakbiti (<i>Macrosiphum euphorbia</i>)	75 ml/da, nimf - ergin	3 gün
Biber (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 L su, larva - pupa	3 gün
Patlıcan (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 L su, larva - pupa	3 gün
Pamuk	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	100 ml/da, nimf - ergin	-
Antepfıstığı	Antepfıstığı Psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	100 ml/100 L su, nimf	14 gün
Pırasa	Thrips (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da, nimf - ergin	3 gün
Soğan	Thrips (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da, nimf - ergin	3 gün
Zeytin	Zeytin Karakoşnili (<i>Saissetia olea</i>)	75 ml/100 L su, nimf	14 gün

**Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.



MOVENTO SC 100

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

100 g/L Spirotetramat

Önce etiketi okuyunuz. Evde kullanmayınız. Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız. Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼' üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Spirotetramat

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var.
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321 Özel müdahale gerekli (bu etiketteki ilkyardım hakkındaki ek açıklamalara bakınız).
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P308+P311 Maruz kalınma veya etkilşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

24 Haziran 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL ELİ...

Mehmet Akif
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkar Cd.
No: 58 Ümitiye / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera), Biber (sera) ve Patlıcan (sera) beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir; alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır.yaz mücadelesi olarak uygulamalar, ilk larva çıkışında bundan 20 gün olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit'in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde



MOVENTO SC 100

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

100 g/L Spirotetramat

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde: Ağzı çalkalayınız. Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

24 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Balıklara zehirlidir, akarsulara bulaştırmayınız. Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz. Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süreyle, ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
34771 Ümraniye /İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ

Bayer AG
Chempark Dormagen 41538 Dormagen
ALMANYA

Mehmet Aktaş
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd
No:53 Ümraniye - İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166

olup yalnız unlubit'in görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönl unlubit'in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Soğan ve pırasada tütün tripsine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenecek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır. Soğan yetiştiriciliğinde, bitki gelişmesinin orta dönemlerinde bitki başına ortalama 30 trips mücadele eşiğidir. Bu rakam genç bitkilerde daha az olup, bitkiler yaşlandıkça bu miktar yükselir.

Pamukta pamuk yaprakbitlerine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Turunçgilde unlubitine karşı, bahçedeki meyveler fındık (greyfurtta ceviz büyüklüğünde) iriliğine geldiği zaman ağacın 4 ayrı yönünden ve içten her ağaç için 5'er meyve olmak üzere toplam 100 meyve kontrol edilir. Kontrol edilen meyvelerin en az 15 adedi bulaşık ise uygulamaya karar verilir.

Turunçgilde kabuklubite karşı yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı *A. citrina*'da 20'den fazla ise veya 100 yaprağa düşen *A. aurantii* miktarı 50'den fazla ise uygulama yapılmalıdır. Uygulama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında- ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra - yapılmalıdır.

Turunçgilde yaprakbitlerine karşı uygulama Mart ve Nisan aylarında ağır (bir ağaçta ortalama 15'ten daha fazla sürgün bulaşık) bulaşmanın görüldüğünde yapılmalıdır.

Karpuzda pamuk yaprakbiti, Domateste patates yaprakbiti ve Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Zeytinde Karakoşnil'e karşı doğal düşmanların zararlıyı baskı altına alamadığı ve parazitlenmenin %50'nin altında bulunduğu yerlerde uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla yumurtaların %50'sinin açıldığı dönemde birinci, %90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılmalıdır.



MOVENTO SC 100

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

100 g/L Spirotetramat

24 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
34771 Ümraniye /İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ

Bayer AG
Chempark Dormagen 41538 Dormagen
ALMANYA

Mehmet Aksoy
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
No: 53 Ümraniye /İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166

MOVENTO SC 100 hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Movento SC 100 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Movento SC 100'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23) harici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



MOVENTO SC 100

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

100 g/L Spirotetramat

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
34771 Ümraniye /İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ

Bayer AG
Chempark Dormagen 41538 Dormagen
ALMANYA

24 Haziran 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR NO: 100

Mevlut Aksoy
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
No: 53 Ümraniye /İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166