

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanncaya kadar karıştırma işleminde devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALIBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

KELT WG 85 buğdayda ve pamukta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra buğdayın çıkış öncesi ve çıkış sonrası 1-2 yapraklı dönemi ile pamuk ve yabancı otların çıkış öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir. Ekim öncesinde iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır. Keseksiz olarak hazırlanan tarlaya buğday ve pamuk tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir. Buğday ve pamuk ile yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır. KELT WG 85 bir toprak herbisiti olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini arttırmaktadır.

**MÜNAVEBE BİTKİLERİ:** KELT WG 85 uygulanmış buğday tarlası, herhangi bir nedenden dolayı bozulursa bozulan alana tekrar ekme kili buğday, 5 ay sonra mısır, ayçiçeği, kanola bitkileri ekilebilir. Diğer münavebe ürünleri için firmamıza danışınız.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

KELT WG 85 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3, 15 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KELT WG 85'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3, 15 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Uygulama zamanında herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Spesifik bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Solunması halinde:** Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarınız ve sakin bir şekilde yatırınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. **Cilt ile temas:** Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. **Göz ile temas:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız. **Yutulması halinde:** Ağzı çalkalayınız. Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Semptomatik tedavi uygulayınız. Özel bir antidot bilinmiyor. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir.

**Uygulama dozu ve zamanı****15 g/da**

Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)

**15 g/da**

Buğdayın 1-2 yapraklı döneminde ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde

**12,5 g/da**

Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)



# kelt®

## 300 g e

Suda dağılabilen granül (WG)

## WG85

% 85 Pyroxasulfone

**Önce etiketi okuyunuz.**

**Evde kullanmayınız.**

**Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**

**Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz,**

**içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**

**Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.**

**İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde**

**ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**GRUBU**

**K3; 15**

**Herbisit (Yabancı ot ilacı)**

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**KELT © WG 85 Bayer Grubu'nun tescilli markasıdır.**

**İÇİNDEKİLER**

Pyroxasulfone

**ZARARLILIK İŞARETLERİ****UYARI KELİMESİ TEHLİKE****ZARARLILIK İFADELERİ**

**H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P260** Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

**P264** Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

**P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

**P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.

**P314** Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.

**P501** İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

**EUH401** İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

**Sırta ekimlerde hiç bir fitotoksite görülmemiştir, ancak aşırı yağışların ardından taban arazilere yapılan ekimlerde geçici fitotoksiteye sebep olabilir.** 150-200 mm/kg yağış miktarı.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / İstanbul

**ÜRETİCİ FİRMA**

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.  
1-4-26, Ikenohata, Taitou-ku, Tokyo,  
110-8782, Japonya

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

**Bitki adı Zararlı organizma adı**

\*Buğday Tilkiyuğuğu  
(*Alopecurus myosuroides*)  
Tarla köpek papatyası  
(*Anthemis arvensis*)  
Kısrı yabani yulaf (*Avena sterilis*)  
Dikanatan (*Galium aparine*)  
Ballıbaba  
(*Lamium amplexicaule*)  
İnce delice (*Lolium rigidum*)  
Hakiki papatya  
(*Matricaria chamomilla*)  
Gelincik (*Papaver rhoeas*)  
Çayır salkım otu (*Poa pratensis*)  
Bülbül otu  
(*Sisymbrium officinale*)  
Yavşan otu (*Veronica spp.*)

\*Buğday Kısrı yabani yulaf (*Avena sterilis*)  
İnce delice (*Lolium rigidum*)

Pamuk Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu  
(*Amaranthus retroflexus*)  
Dancan (*Echinochloa crus-galli*)  
Sürüncü Sütleğen  
(*Euphorbia prostrata*)  
Semizotu (*Portulaca oleracea*)

\*Ekme kili buğday



**Bayer**

TR84507571E (430x230)

**e** ve dolum miktar yüksekliği  
6,5 mm'dir.

6,5 mm | **300 g e**