

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMANIN ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates (sera)	Domates Mildiyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 ml /100 L su	7 gün
Patates	Patates Mildiyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 ml/da	14 gün
Kavun	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	350 ml/da	7 gün
Soğan	Soğan Mildiyözü (<i>Peronospora destructor</i>)	350 ml/da	14 gün
Bağ*	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	350 ml /100 L su	21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine karışım su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işleminde devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposuna güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıya ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Mildiyözü; İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanılır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patates Mildiyözü; çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ve hastalık koşullarının devam etmesi durumunda 7-10 gün arayla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Kabakgöl Mildiyözü; Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı, hava koşulları ve hastalığın seyrine göre uygulamaya devam edilmelidir.

Soğan mildiyözü; Uygulamaya hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı, hava koşulları ve hastalığın seyrine göre uygulamaya devam edilmelidir.

Bağ mildiyözü: 1. İlaçlama sürgünler 25-30 cm boyunda iken 2. ve diğer ilaçlamalar ise hastalık için uygun koşullar devam ediyorsa .ilacin etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MOLTOVİN 225 SC etki mekanizmasına göre Grup M1 ve 27 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MOLTOVİN 225 SC'nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 ve 27 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.

MOLTOVİN® 225 SC

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İltih ve gözle teması halinde tahrişe neden olur. Solunması veya yutulması halinde baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve terlemeye neden olur. Zehirlenme durumunda doktor çağırınız. İlacın ambalaj ve etiketini gösteriniz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bu ürünün ambalaj veya etiketini doktora gösteriniz. **Solunması Halinde:** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. **Yutulması Halinde:** Kusma meydana gelirse mideyi tahriş eder. Ağzı su ile temizleyin. Kusma meydana gelirse, hemen tıbbi yardım alın. **Ciltle Teması Halinde:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi sabun ve bol su ile iyice yıkayın. **Gözlerle Teması Halinde:** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilenler baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	27	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	----	-------------------------

190 g/l Metalik Bakıra eşdeğer bazik bakır sülfat +
35 g/l Cymoxanil

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Ruhsat Tarihi ve No : 19.06.2017 / 10919

Net miktarı: **1 LT**

İÇİNDEKİLER:

Bakır sülfat, Cymoxanil

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH208 Cymoxanil / 1,2 –benzisothiazolin-3-on içerir.

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaj veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmayınız.

- Ürünü kapalı orijinal ambalajında, ısı kaynaklarından uzakta depolayınız.

- Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerden, gıda ve yemlerden uzakta muhafaza ediniz.

- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.

- Anlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında açılmamış orijinal ambalajlarında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA:

NUFARM S.A.S.
28, Boulevard Camelint BP 75
92233 Gennevilliers
Cedex FRANSA
Tel. : +33 1 140 85 50 50

ÜRETİM YERİ:

NUFARM GmbH & Co KG
A-4021 Linz
St.-Peter-StrBe 25
AVUSTURYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER İTH. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Mimar Sinan Mah.Mimar Sinan Cad. No:673 Çekmeköy/İstanbul
Tel: 0-216- 641 86 41



TR86722550A (273x150)



NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.