

**Hem dar hem geniş yapraklı
yabancı otlara mükemmel etki...**

Kullanım Alanı

Bitki	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Mısır*	Horoz ibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>)	12,5 g/da + 200 ml/da Mero** Çıkış sonrası, mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyüme- lerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak, kardeşlenme)
	Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Yapışkan ot (<i>Seteria verticillata</i>) Yabani bamyas (<i>Hibiscus trionum</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theoprasitii</i>)	15 g/da + 200 ml/da Mero** Çıkış sonrası, mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak, kardeşlenme)

* Çin mısırında ve tatlı mısırdaki kullanılmaz.

** Mero yayıcı yapıştırıcı olup, Ekipp super ile birlikte önerilen dozda mutlaka kullanılmalıdır.

Çıkış sonrası yabancı ot kontrolünde rakipsiz...

Bayer bir ZİMİD üyesidir.

Zehirlenme halinde başvurunuz: **Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114**

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Tarım İlaçları Bölümü

Genel Müdürlük

Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon: 0216 / 528 38 56 - 57 Faks: 0216 / 528 38 68

**Trakya ve Marmara
Bölge Müdürlüğü**

Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon: 0216 / 528 38 61
Faks : 0216 / 528 38 68

Ege Bölge Müdürlüğü

858. Sok. No: 5 Kat: 1
Konak 35251 İZMİR
P.K. 204 Konak-İZMİR
Telefon: 0232 / 484 82 49
0232 / 484 86 16
Faks : 0232 / 483 63 33

**Güneybatı Anadolu
Bölge Müdürlüğü**

Burhanettin Onat Cad.
Seyitözü Vakfı Apt. A Blok
No: 98/8 07100 ANTALYA
Telefon: 0242 / 322 35 44
0242 / 322 97 40
Faks : 0242 / 321 72 70

**Güney Anadolu
Bölge Müdürlüğü**

Haç Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi 1. Cad. Atatürk Bulvarı
No:11 Yakapınar-ADANA
Telefon: 0322 / 394 34 74
0322 / 394 34 75
Faks : 0322 / 394 34 76

**Orta Anadolu ve Karadeniz
Bölge Müdürlüğü**

Necatibey Cad.
Sezenler Sok. No: 1/8 K: 4
06430 ANKARA
Telefon: 0312 / 230 11 15
0312 / 230 25 28
Faks : 0312 / 230 56 10

**Güneydoğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü**

SAMSUN Bürosu:
Çiftelhamam Cad. No: 12
Vakıf İş Hant Kat. 2 Büro 13
55020 SAMSUN
Telefon: 0362 / 435 39 31
0362 / 435 10 29
Faks : 0362 / 432 82 22

**Güneydoğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü**

Esentepe Mah. 299. Sokak
Avsaroglu Apt. Kat: 1 No: 4
63300, ŞANLIURFA
Telefon: 0414 313 83 87
Faks : 0414 314 35 91

Ekipp[®] super Tek ilaçlama ile dar ve geniş yapraklı yabancı otlara süper etki...

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

%30 Foramsulfuron + %1 Iodosulfuron-methyl-sodium

Ekipp[®] super mısır tarlalarında dar (yıllık ve çok yıllık) ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanan sistemik bir ilaçtır. İlaç uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile bünyeye alınıp yabancı otun içine taşınır. Çok yıllık çimensi otlarda, özellikle Kanyaş'ta (Geliç) rizomlara kadar ilerler. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece mısır bitkisiyle rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

Mero Ekipp[®] super'in özel yayıcı yapıştırıcısıdır. **Ekipp[®] super**'in yabancı otun yapraklarından daha iyi alınıp, tüm organlarında yayılmasını sağlar. Bu nedenle mutlaka **Ekipp[®] super** ile birlikte kullanılmalıdır.

Tarlanızda Kanyaş (Geliç) varsa Ekipp süper uygulamasından 7-10 gün önce ve sonra çapa yapmayınız. Çapa Kanyaş rizomlarını (toprak altı gövdeleri) parçalayacağı için etki düşer.



Horoz ibiği
(*Amaranthus retroflexus*)



Sirken
(*Chenopodium album*)



İmam pamuğu
(*Abutilon theophrastii*)



Şeytan elması
(*Datura stramonium*)



Domuz pıtrağı
(*Xanthium strumarium*)



Yabani banya
(*Hibiscus trionum*)



▶ **Ekipp[®] super** uygulamasından
6 gün sonra Kanyaşlar



▶ **Ekipp[®] super**
uygulamasından
14 gün sonra
Kanyaşlar



▶ **Ekipp[®] super** uygulamasından 14 gün
sonra Sirkenler



▶ **Ekipp[®] super**
uygulamasından
6 gün sonra İmam
pamuğu ve Kanyaş



▶ **Ekipp[®] super** uygulamasından
6 gün sonra Domuz pıtrağı



Kanyaş (Geliç)
(*Sorghum halepense*)



Benekli darıcan
(*Echinochloa colonum*)



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)

▶ Kullanma şekli

Motorlu sırt atamizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litre olmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalıdır. İlacın uygulanmasından önce veya sonra organik fosforlu insektisitler kullanıldığında ürüne zarar verebilir.

Ekipp[®] super mutlaka **Mero** ile tabloda önerilen dozda kullanılmalıdır.

Mero dışında başka maddelerle kullanılmamalıdır.

Uygulamadan 2 saat geçtikten sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

İlaçlama yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu ve toprak neminin yeterli olduğu zaman yapılmalıdır.

▶ Karışılabilirlik durumu

Ekipp[®] super, Decis, Bulldock ve yaprak gübrelere ile karıştırılarak kullanılabilir. Çinko içerikli yaprak gübrelere ile karıştırılacaksa mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır. Organik fosforlu ilaçlarla karıştırmayınız.



Semizotu
(*Portulaca oleracea*)



Köpek üzümü
(*Solanum nigrum*)



Yapışkan ot
(*Setaria verticillata*)