

ÇELTİK YANIKLIĞINA KARŞI GÜÇLÜ ETKİNİN ADI FIZION® WG 50

FIZION®
WG 50



FIZION® WG 50

Çeltik yanıklığına karşı Bayer'in güçlü çözümü Fizion® WG 50, bitkinin her döneminde kullanım olanağı sağlar. Fizion® WG 50 **koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahiptir**. Trifloxystrobin, strobilurin grubundan bir aktif madde olup bitkiye son derece güvenlidir.

HANGİ HASTALIĞA KARŞI ETKİLİ?



Çeltik yanıklığının yapraktaki zararı



Çeltik yanıklığının başak ve taneye etkisi

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	20 g/da	35 gün

UYGULAMA ZAMANI



Hava koşullarının hastalığa uygun olduğu ya da hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez hemen uygulamaya başlanmalıdır.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.

Bayer Türk Kimya san. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye 34770 İstanbul

Telefon: 0216 / 528 36 00 Faks: 0216 / 528 38 68 www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz. Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zırai mücadele problemleriniz için firmamıza başvurabilirsiniz. **Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD** üyesidir.

FieldView



4 Mevsim

Kazanlar Kulübü'ne erişmek için 4 Mevsim uygulamasını indirin.



Safety Seal



Bayer Website

