

Çıkış öncesi uygulama ve uzun süreli etki ile pamukta erken yabancı ot kontrolü

Ürün Grubu : Herbisit, K3; 15

Etkili madde : % 85 Pyroxasulfone

Formülasyon : WG (suda dağılılan granül)

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

Bitki adı	Yabancı ot adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
*Buğday	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Balıbbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gellincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Küçük başaklı kuşyemi (<i>Phalaris minor</i>) Çayır salkım otu (<i>Poa pratensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>) Kalemfetük (<i>Vulpia spp.</i>)	15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)	-
Pamuk	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Sürünücü sütlağen (<i>Euphorbia prostrata aiton</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	12,5 g/da Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)	-

*Ekmeklik buğday

Münavebe Bitkileri

Kelt WG 85 uygulandıktan sonra takip eden ürünlerde pamuk, mısır, ayçiçeği, kanola ve ekmeklik buğday ekilebilir.

Firma Beyanı:

Firma ürünün etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez. Sıta ekimlerde hiç bir fitotoksite görülmemiştir, ancak aşırı yağışların ardından taban arazilere yapılan ekimlerde geçici fitotoksitaya sebep olabilir. 150-200 mm/kg yağış miktarı.

Uyarı

Buradaki bilgiler tanıtım amaçlıdır ve zaman içinde ilaveler ya da değişiklikler olabilir. Bu nedenle en güncel bilginin ürün etiketinde yer alan bilgiler olduğunu ve uygulama öncesi etiket bilgilerinin dikkate alınması gerektiğini unutmayınız.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ömeriye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 38 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.turk.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Ziraat müdahale problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÖAB ve ZİMİD üyesidir.



Pamuk yabancı ot mücadelesinde;

Kelt ile erken önlem al verimin yüksek olsun!



kelt

Kelt WG 85 Herbisit (Yabancı ot ilacı) Aktif madde : % 85 pyroxasulfone

KELT WG 85

- Erken çıkan dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol eder.
- Yabancı otların pamuk ile rekabetini ortadan kaldırır.
- Erken yabancı ot kontrolünü sağlayarak yabancı otların gübre ve su tüketimini önler.

TOPRAK HAZIRLIĞI

- Ekim öncesi toprak hazırlığı çok önemlidir.
- Toprak keseksiz olmalı, bitki artıkları uygun tarım ekipmanları ile parçalanarak toprağa karıştırılmalı veya tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Pamuk tohumları mibzer ile ideal toprak derinliğine (4-5 cm) ekilmeli.



PAMUKTA RUHSATLI DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR



Kırmızı köklu tiki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)



Dastan
(Echinochloa crus-galli)



Sürünücü sütleğen
(Euphorbia prostrata aiton)



Semizotu
(Portulaca oleraceae)

KULLANIM ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

- Kelt WG85, bir toprak herbisiti olduğu için uygulama döneminde pamuk ve yabancı otların çıkmamış olması gerekir.
- Pamuk ekiminden hemen sonra toprak nemini kaybetmeden kullanılmalıdır.
- Uygulamada 2 kat ilaçlamadan kaçınılmalıdır.
- İyi bir yabancıot kontrolü için uygulamadan sonra yeterli nem olmalı veya yağmurlama sulama yapılmalıdır.
- İlaçlamada dekara 30-40 lt su kullanılmalıdır.
- İlaçlama esnasında karıştırıcı açık olmalı ve uygun basınçta çalışmalıdır.
- Uygulama günün serin saatlerinde ve rüzgarsız havada yapılmalıdır.

