

Haşhaş üretiminde kazancınızı yeniden hesaplayın...


Ürün Grubu : Herbisit

Etkili madde: %44 Tembotrione + %22 Isoxadifen

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml / da Çıkış-sonrası (Mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemde)	90 gün
Haşhaş	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hidirellez otu (<i>Hypeceum pseudograndiflorum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	200 ml / da Çıkış-sonrası (Haşhaş ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-4 yapraklı dönemde)	70 gün

Uygulama zamanı



Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz. Bayer, yenilebilir ürünlerde kullanılmakta olan bitki koruma ürünleri için tüm pazarlarda Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) / İthalat Toleransları (IT) bulunmayabileceğinin farkındadır. Bunun yanı sıra, MRL / IT değerleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Alıcı, müşterilerini, bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce MRL'ler ve ithalat toleransları hakkındaki en son bilgileri ürünlerini ihraç eden kişilerle birlikte kontrol etmeleri ve şüphe durumunda destek için yerel Bayer temsilcisiyle iletişime geçmeleri konusunda bilgilendirmeyi kabul eder.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 36 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.tarim.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Ziraî mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.



Laudis Etkisini Keşfedin

Güçlü Etki - Mükemmel Uyum



Haşhaş'ta Laudis Avantajları

- Bitki güvenliğinde yeni standart.
- Hızlı ve görülebilir etki.
- Farklı aktif madde olması nedeniyle direnç gelişimini engeller.
- Üstün yabancı ot mücadelesi ile verime olumlu katkı sunar.
- Yeni formülasyon teknolojisi ile güç ve uyumu birleştirir.
- Isoxadifen bitkide güvenliği artırırken, yabancı ot içerisinde daha hızlı çalışmasına da neden olur.
- İlaçlamadan iki saat sonra yağacak yağmurdan etkilenmez.



Kontrol



Laudis


Uyarı

- Haşhaş bitkisi 2-8 gerçek yapraklı dönemde, yabancı otların ise 2-6 yapraklı aktif gelişim döneminde uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama öncesi kalibrasyon yapılarak dekara atılacak ilaçlı su miktarı belirlenmeli (20-40 lt/da) ve iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.

Çobanlar/Afyon



90 Gün sonra



2.0 L/ha

4.0 L/ha

Kullanımda Dikkat Edilecek Hususlar

- Hava açık ve sıcaklık 10 derece üzerinde olmalıdır.
- Kullanım sonrası günlerde hava sıcaklığında 5 derece altına düşüş bekleniyorsa ilaçlama kesinlikle ertelenmelidir.
- Dar yapraklı yabancı otlar problemse karışım yapılmalıdır.
- Etki spektrumu dışındaki yabancı otlar hakimse kullanılmamalıdır.
- Kullanım esnekliği vardır (hem sonbahar hem ilkbahar döneminde).
- Çapa işçiliğini minimuma düşürür.
- Çapalamanın verdiği mekanik zarar ortadan kalkar verim artışı sağlar.