



NATIVO®



WG 75

**CERCOSPORA VE
KÜLLEMESİNE KARŞI
NATIVO® WG 75
FARKINI YAŞAYIN**

NATIVO® WG 75

Şeker pancarında yaprak leke hastalığı (*Cercospora*) verim kaybına yol açarken, aynı zamanda pancarın kalitesinin ve şeker oranının da azalmasına neden olur. Bayer'in şeker pancarındaki çözümü **Nativo® WG 75** koruyucu ve tedavi edici etkisiyle güçlü hastalık kontrolü sağlar.

HANGİ HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ?



Külleme
(*Erysiphe betae*)



Yaprak Leke Hastalığı
(*Cercospora*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Hastalık adı	Uygulama dozu ve zamanı	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Mısır	Mısır yaprak yanıklığı (<i>Setosphaeria turcica</i>)	30 g / da	21 gün
Nohut	Antraknoz (<i>Ascochyta rabiei</i>)	25 g / da	14 gün
Soğan Sarımsak	Soğan ve sarımsak pası (<i>Puccinia porri</i>)	30 g / da	21 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	20 g / da	35 gün
Şeker Pancarı	Külleme (<i>Erysiphe betae</i>)	25 g / da	-
	Cercospora		

NATIVO® WG 75 ÖZELLİKLERİ

- Sistemik ve mezostemik etki ile yüksek hastalık kontrolü sağlar.
- Koruyucu ve tedavi edici özelliği sayesinde uzun süreli koruma sağlar.
- Etkili hastalık kontrolü ile verim ve kalite artışı sağlar.
- Bitkinin her döneminde güvenle kullanılabilir.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 36 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.

