

Gerçek
**cicek
gücü**
keşfine çıkın

Lusen®

KAZANMAK İSTERSEN!



Hastalıklara karşı yüksek performans
Mücadelede yeni referans

Lusen®
SC 500





LUSEN® SC 500

Yeni nesil bir fungusit olan Lusen® SC 500, güçlü korumanın yanı sıra bitki yeşil aksamının sağlıklı görüntüsünü her daim destekler. Kayısı ve kirazda Çiçek Monilyası, şeftalide ise Külleme hastalıklarına karşı koruyucunuz olan Lusen® SC 500, çiçek döneminde yüksek etkinlik gösterir. Ayrıca kirazda meyve döneminde sorun olan Meyve Monilyası hastalığına karşı da etkili olan Lusen® SC 500, sağlıklı bir yaşam döngüsünü mümkün kılarken, bitkinin hem daha yeşil ve sağlıklı görünmesini sağlar hem de yüksek verimin yardımcı olar. Ayrıca ürünün raf ömrüne de olumlu katkılar sağlar.

ÜSTÜN ETKİ ŞEKLİ

Lusen® SC 500 içeriğinde bulunan Fluopyram ve Trifloxystrobin aktif maddeleri sayesinde, hastalık etmeninin yaşam döngüsünün her evresinde etki gösterir. Yalnızca bitkinin yüzeyinde koruma sağlamakla kalmaz, bitki dokuları içinde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabilecek bir karışımdır.

Fluopyram hem kontak hem de sistemik olarak çalışabilen, SDHI grubuna ait koruyucu ve tedavi edici özellikte bir fungusittir. Trifloxystrobin hem kontak hem de mesostemik olarak çalışabilen, Strobilurin grubuna ait koruyucu ve tedavi edici özellikte bir fungusittir.

LUSEN® SC 500 KİLİT ÖZELLİKLERİ



GÜÇLÜ KORUMA

Çiçek monilyası ve küllemeye karşı üstün ve uzun süreli koruma sağlar.



SAĞLIKLI GÖRÜNÜM

Yeşil aksam gelişimini teşvik ederek daha sağlıklı görünüm kazandırır.



YÜKSEK VERİM

Albenisi yüksek, daha kaliteli ve verimli üretim yapmaya yardımcı olur.



UYGUN MALİYET

Uygun maliyetlidir. Mücadeleye ek yük getirmez.



UZUN RAF ÖMRÜ

Hasat sonrası ürünün raf ömrünü uzatarak depolamada avantaj kazandırır.



ÇİÇEK VE MEYVE MONİLYASI HASTALIĞI

Çiçek monilyası hastalığında ilk enfeksiyon, önceki yıl hastalanmış dal ve meyvelerden çiçeklere bulaşarak oluşur. Hastalanan çiçeğin rengi zaman içinde kahverengiye döner ve dal üzerinde kuruyarak mumyalaşır. Hastalık çiçek sapından sürgünlere geçerse onlar da kahverengileşir ve ince sürgünler zaman içinde kururken, kalın sürgünlerde kanser yaraları oluşur. İleri dönemlerde çiçek enfeksiyonlarını meyve enfeksiyonları takip edebilir. Kirazda meyve enfeksiyonları genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemlerde meydana gelir. İlk belirtiler meyve üzerinde oluşan kahverengi lekelerdir. Bu lekelerden içe doğru çürüme başlar. Daha sonra bu bölgelerde hastalığın yayılmasını sağlayan beyaz-yeşil renkli sporlar oluşur. Meyve zamanla buruşup kurur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır.



ŞEFTALİ KÜLLEMESİ HASTALIĞI

İlkbaharda genç sürgün uçlarındaki yapraklarda önce hafifçe bir kabarıklık, yağlı bir görünüş ve renk açılması meydana gelir. Daha sonra kabarıklığın arkasındaki yüzeyde gri-beyaz unlu bir tabaka oluşur. Yaprığın şiddetli enfeksiyona uğrayan kısmı az gelişir ve içe doğru kıvrılır ve erken dökülür. Sürgünler ise bulaşma yerinden bükülür ve gelişimi yavaşlar. Hastalıklı sürgünlerin uçları kütleşerek göz oluşumu engellenir. Hastalık, oluşacak meyve sayısı ve kalitesini etkiler.



LUSEN® SC 500 İLE NE KAZANACAKSINIZ?

- Kayısı ve kirazda Çiçek Monilyası ve Meyve Monilyası, şeftalide ise Külleme hastalıklarına sağladığı **üstün koruma ile sağlıklı bir ürün** elde edersiniz.
- Sürgünlerin sağlıklı kalması** suretiyle ertesi yılın verimini de koruma altına almış olursunuz.
- Daha yeşil ve sağlıklı ağaçlardan **daha yüksek verim** alırsınız.
- Çiçek ve Meyve Monilyası ve Külleme hastalıklarına karşı **uygun maliyetle en etkin mücadeleyi** yaparsınız.
- Sağlıklı ve yüksek verim ile **daha fazla kazanç** sağlarsınız.

LUSEN® SC 500

Ürün Grubu : Fungisit
Etkili Madde : 250 g/L Fluopyram + 250 g/L Trifloxystrobin
Formülasyon : SC (Süspansiyon konsantre)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kiraz	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Kiraz	Meyve Monilyası [<i>Mumya</i>] (<i>Monilinia fructigena</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Bağ*	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	20 ml/100 L su	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığında Karazenk Hastalığı (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	20 ml/100 L su	10 gün
Biber (sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Biber (tarla)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>)	25 ml/da	7 gün
Domates (sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Domates (tarla)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> , <i>Oidium neolyopersici</i>)	25 ml/da	7 gün
Hıyar (sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Kabak (sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Kornişon (sera)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Kavun (tarla)	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	20 ml/100 L su	3 gün
Karpuz (tarla)	Kabakgillerde Antraknoz (<i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Colletotrichum lagenarium</i>)	20 ml/da	3 gün
Ayva	Ayva monilyası (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	25 ml/100 L su	14 gün
Fındık	Fındıkta Külleme Hastalığı (<i>Erysiphe sp.</i>)	20 ml/da	10 gün
Şeftali	Şeftali Küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Badem	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	25 ml/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.
Diğer ruhsatlı olduğu mahsuller için web sitesini ziyaret edin.

DOĞRU KULLANIM ŞEKLİ

ÇİÇEK MONİLYASI HASTALIĞINA KARŞI

Birinci ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
İkinci ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

MEYVE MONİLYASI (MUMYA) HASTALIĞINA KARŞI

Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

ŞEFTALİ KÜLLEMESİ HASTALIĞINA KARŞI

Birinci ilaçlama: Sürgünler yaklaşık 20 cm olduğunda,

İkinci ve diğer ilaçlamalar: Enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek 14 gün ara ile yapılır. Aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını (en fazla iki uygulama) aşmayınız.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.

Bayer Türk Kimya san. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye 34770 İstanbul

Telefon: 0216 / 528 36 00 Faks: 0216 / 528 38 68 www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz. Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz. **Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD** üyesidir.



Söz konusu bu materyal herhangi bir şekilde internet üzerinden ve sosyal iletişim araçları ile tanıtım ve satış amaçlı kullanılamaz. İşbu broşür tanıtım ve satış yapma maksadı ile veya fiyat indirimi kampanyası uygulamak veya başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Bu broşür kullanılarak video ve görsel oluşturularak tanıtım amaçlı paylaşım yapılamaz.